

### QUÉ HACER SI TIENE SÍNTOMAS

- Si presentar 2 o más síntomas compatibles con COVID-19 (Fiebre  $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ , Tos, Odinofagia, Disnea, Cefalea, Mialgias, Disgeusia/anosmia, Diarrea/vómitos, Rinitis/congestión nasal)

**o tiene**

- Test de COVID 19 detectable

**DEBE aislarse 5 días y luego hacer 5 días más de cuidados (\*) (barbijo, higiene de manos, distanciamiento) esté vacunado o no.**

*Excepción: paciente internado con COVID-19 se aísla por 10d*

### A QUIÉN HISOPAR

Priorizar el diagnóstico etiológico a toda personas con 2 o más síntomas compatibles con COVID-19 y alguno de los siguientes:

- es mayor de 50 años
- tiene condiciones de riesgo,
- embarazada.
- requiere internación por infección respiratoria aguda compatible con COVID-19
- desarrolla síntomas estando internado.
- es personal de salud

### ALGORITMO PARA HISOPAR

1. Solicitud del Kit para hisopar: al laboratorio de Terapia (piso 10). (A partir del 15/12/2022)
2. Las muestras deben tomarse de lunes a viernes y trasladarlas a la guarida antes de las 11.30 hs
3. *Paciente ambulatorio*: la Guardia realiza los hisopados.
4. *Pacientes internados*: el médico de piso realiza los hisopados. Traslada los a la guardia. (ver punto 2)
5. La guardia realiza el acopio de todas las muestras del hospital y las traslada a la Facultad de Medicina donde realizan PCR COVID-19.

### USO DE BARBIJO

**USO RECOMENDADO:**

- Toda persona que ingresa al hospital.

**USO OBLIGATORIO:**

- Al ingresar a los consultorios, las salas de internación, la guardia y los lugares cerrados.
- Para la atención de pacientes.
- Toda persona con síntomas compatibles con COVID-19
- Contacto estrecho de casos confirmados de COVID-19
- Acompañantes y visitas de pacientes internados, al ingresar a la sala de internación y durante toda su permanencia en dicha sala.

### MANTENER LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN TODOS LOS ÁMBITOS (\*)

- Asegurar la ventilación de los ambientes.
- Higiene de manos adecuada y frecuente.
- Al toser o estornudar cubrir la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelos descartables.

**Ante presencia de síntomas evitar el contacto con otras personas, no acudir a actividades laborales, sociales, educativas, lugares públicos y evitar el uso de transporte.**