

PANDEMIA COVID-19

AISLAMIENTO PREVENTIVO- Manejo en Sala de Internación- Noviembre 2021

- Objetivo:** - la seguridad del personal del Hospital y de los pacientes.
- Destinado para la **atención de los pacientes y el contacto con las personas.**
- Aplicar en **todas las salas de internación.**

1. Aplicar **PRECAUCIONES ESTANDARES** para la atención de todos los pacientes:

- **Higiene de manos:** SIEMPRE
- **Cuidado de la tos:** cubrir boca y nariz con pliegue del codo al toser o estornudar.
- **Uso de guantes:** para el contacto con mucosa o fluidos.
- **Uso de camisolín:** en procedimiento que genere salpicaduras (camisolín estéril en procedimiento invasivo: Colocar CVC, punción lumbar, etc.)
- **Barbijo y protección ocular:** SIEMPRE.
- **Desechar** cortopunzantes en descartadores rígidos. Residuos patogénicos en bolsa roja..

2. Uso de **BARBIJO QUIRURGICO y PROTECCION OCULAR:**

- Usar BARBIJO QUIRURGICO al **ingresar al Hospital y MANTENER** durante toda la jornada laboral.
- Cubrir totalmente boca, nariz y mentón.
- Retirar solamente en el momento de refrigerio y asegurándose de mantener un distanciamiento >1.5 metros entre las personas.
- Cambiar el barbijo según necesidad.
- Se aconseja protección ocular durante la jornada laboral.

3. Medidas de **PREVENCIÓN** en las SALAS de INTERNACIÓN:

- Puerta de ingreso a la sala debe estar **siempre cerrada.**
- Ingresar al sector de internación con **protección de boca, nariz y ojos :**
 - # Barbijo quirúrgico con protección ocular (Antiparras o máscara facial)
 - # Barbijo N95 cuando corresponda con protección ocular.
- Uso de camisolín para los pacientes con aislamiento específico y al realizar procedimientos que generen salpicaduras.

4. Uso de **CAMISOLIN :**

- Supervisor de enfermería:** será el responsable de proporcionar camisolines según necesidades.

1. USAR camisolín para realizar un **PROCEDIMIENTO que genera SALPICADURAS**

Camisolín estéril para todo procedimiento INVASIVO.

2. USAR camisolín para la atención de pacientes con indicación de **AISLAMIENTO de CONTACTO:** :

Deben estar en habitación individual o puede estar en cohorte con los pacientes con igual patógeno.

AISLAMIENTO EMPIRICO

- Sospecha de COVID-19
- Infección respiratoria/gripe
- Vesículas cutáneas.
- Diarrea aguda.
- Conjuntivitis.
- Abscesos cutáneos o heridas abiertas.
- Sospecha Infección /colonización por gérmenes multiresistentes.

AISLAMIENTO DIRIGIDO

- COVID-19 confirmado.
- Infección respiratoria por otros virus respiratorios: Influenza, Adenovirus, etc.
- Varicela/ Herpes Zoster.
- Diarrea aguda infecciosa.
- Ectoparásitos.
- Infección /colonización por gérmenes multiresistentes: EVR, KPC, etc.

3. **Técnica de uso del camisolín:**

- Colgar un camisolín en un **perchero DENTRO de la habitación** del paciente. Solo colgar un camisolín por perchero.
- Colgarlo con la parte externa del camisolín contra la pared y al volver a colocárselo lo hará por el lado interno.
- Descartar a las 24 hs. Cada mañana cambiar el camisolín de cada habitación en aislamiento. Descartar en bolsa roja.
- Descartarlo si se mancha con fluidos corporales.

4. **Personal NO Fijo en la sala de internación:** Interconsultor, Kinesiólogo, Técnico, Extraccionista, Mucamo, Camarero, Camillero.

- Usar el camisolín según técnica de uso (Ver Punto 3)
- Si ingresa a la sala con camisolín de uso continuo, rociarlo con alcohol 70% entre pacientes.
Al ingresar a una habitación con aislamiento colocarse sobre el camisolín propio, el camisolín colgado en el perchero.
Al retirarse de la habitación dejar colgado, el camisolín de la habitación, en el perchero con la parte externa del camisolín contra la pared.