División Gastroenterología
Av. Córdoba 2351 (CABA) 4 Piso Sala 2
Te.: 59508786

Clostridium difficile

Solicitud de detección de la toxina A y B, enzima GDH

Datos del paciente

Nombre: Apellido:
Edad: años Sala: Cama: H. Clínica N°:
Cobertura: N° de beneficiario;

Medico solicitante: Te:

Características de la diarrea

- ☐ Asociada a centros de salud**:** paciente que desarrolla diarrea 48 horas posteriores al ingreso al hospital
- ☐ Comunitaria**:** infección por CD que ocurre en la comunidad o en las primeras 48 horas de hospitalización, sin hospitalización previa en un período mayor a 12 semanas.
- ☐ Indeterminada: aquellos pacientes con infección por CD que se desarrolla en la comunidad entre 4 y 12 semanas del alta hospitalaria

Tiempo de evolución: días N° de deposiciones / día:
Forma:

☐ Líquida ☐ Blanda ☐ Mucosa ☐ Lientérica

Otros Síntomas

☐ Fiebre: °C ☐ Náuseas ☐ Dolor abdominal ☐ Íleo
☐ Íleo ☐ Megacolon toxico ☐ Hematoquezia ☐ Alteración del sensorio

Episodios previos de diarrea por Clostridium Diffisile N°:

Enfermedades concomitantes:

☐ Diabetes ☐ Insuf. Renal Crónica ☐ Enfermedad inflamatoria intestinal ☐ Enfermedad coronaria
☐ Anemia ☐ Infección genitourinaria ☐ Hipotiroidismo ☐ Cáncer
☐ Sepsis ☐ Osteomielitis ☐ Hepatopatía crónica ☐ Trasplante de órganos
☐ Otrras:
☐ Cirugía gastrointestinal en los últimos 6 meses

Tratamientos previos:

☐ IBP ☐ Bloqueantes H2 ☐ Corticoides ☐ Inmunosupresores
☐ Quimioterapia

Antibióticos

☐ Ampicilina	☐ Quinolonas	☐ Vancomicina
☐ Amoxicilina	☐ Macrólidos	☐ Metronidazol
☐ Cefalosporinas	☐ Tetraciclinas	☐ Aminoglucósidos
☐ Clindamicina	☐ Cloranfenicol	☐ Rifampicina
Otro:	Indicación:	

Laboratorio:

Hct: % Hgb: N° de Leucocitos: mm Albumina: gr/d Lactato: mmlo/l

Firma y sello

División Gastroenterología
Av. Córdoba 2351 (CABA) 4 Piso Sala 2
Te.: 59508786

La muestra adecuada para el diagnóstico, en nuestro laboratorio, de la diarrea producida por Clostridium difficile son heces acuosas, sueltas o no formes (mínimo de 2 ml) recogidas en un recipiente estéril, de boca ancha, con cierre hermético, sin conservantes ni medio de transporte (muestra de heces frescas), debidamente rotulados con los datos del paciente, N° de historia clínica, lugar de internación (sala y cama) y fecha, acompañado de presente formulario de solicitud del examen.

Si el paciente usa pañales para obtener la muestra se deben colocar al revés y así evitar que se absorban la deposición.

Se recomienda recoger una sola muestra de heces durante el curso de un mismo episodio de infección por Clostridium difficile, dado que la detección rutinaria de múltiples muestras apenas aumenta el rendimiento y puede generar falsos positivos por lo que se considera una práctica no costo efectiva.

No se recomienda la detección de C. difficile para la confirmación de la curación pos tratamiento, ya que no tiene correlación con la resolución de los síntomas.

Únicamente en aquellos casos en los que no sea posible obtener muestra de heces (íleo, megacolon tóxico o distensión abdominal sin diarrea) se podrá aceptar una muestra rectal o peri rectal.

El transporte de las muestras debe realizarse lo antes posible a nuestro Laboratorio del Programa de Estudios Pancreáticos ubicado en el 4° Piso - Sala 2.

Si la muestra no puede entregarse de forma inmediata se recomienda conservarla en frío (2-8°C) durante las primeras 48-72 Hs o congelarla (- 20°C) si no se va a durante las 72 horas posteriores a su recolección.