



ACCIÓN	DROGA	PRESENTACIÓN	ADMINISTRACIÓN		ESTABILIDAD	DOSIS EQUIVALENTES
			VÍA	RECOMENDACIONES		
CORTA	HIDROCORTISONA	Ampollas 100 y 500 mg	IM (no aplicar en Deltoide)	Reconstituir en 2 ml (100 mg) o 5 ml (500 mg) de API Cc recomendada: 50 mg/ml Administrar en un período de 30 seg. (100 mg) a 10 min. (500 mg o mayores)	24 hs reconstituido en heladera (2°C – 8°C)	20 mg
			Bolo EV			
			Infusión EV	Reconstituir y luego diluir en 100 – 1000 ml (100 mg) ó 500 – 1000 ml (500 mg) de Dx 5% o SF Cc recomendada: 1 mg/ml La infusión EV debe hacerse en 30 min		
		Comprimidos 10 mg	VO	Con las comidas para evitar molestias GI	Dentro del blíster hasta fecha de vencimiento	
INTERMEDIA	METILPREDNISONA (Deltisona B®)	Comprimidos 4, 8 y 40 mg	VO	Administrar por la mañana Con las comidas para evitar molestias GI	Dentro del envase original hasta fecha de vencimiento	4 mg
		Gotas 0,4 mg/ml (0,2 mg/gota)				
	METILPREDNISOLONA (Solu-Medrol®)	Ampollas 500 mg (+ solvente de reconstitución)	IM (no aplicar en Deltoide)	Reconstituir con el solvente provisto por el fabricante	48 hs reconstituido o diluido a temperatura ambiente o heladera (2°C – 8°C) Proteger de la luz	
			Bolo EV			
			Infusión EV	Reconstituir con el solvente provisto por el fabricante y luego diluir con Dx 5% o SF Administrar en un período no menor a 5 min. (dosis ≤ 250 mg) y hasta 30 min. (dosis > 250 mg)		
PREDNISONA	Comprimidos 5, 20 y 50 mg	VO	Administrar por la mañana Con las comidas para evitar molestias GI	Dentro del blíster hasta fecha de vencimiento	5 mg	
DEFLAZACORT	Comprimidos 6 y 30 mg	VO	Por la mañana, con un poco de líquido	Dentro del blíster hasta fecha de vencimiento	6 mg	
PROLONGADA	BETAMETASONA	Sal fosfato+acetato: ampollas 6 mg/ml (Celestone®)	IM	Suspensión inyectable únicamente para uso IM	Dentro del envase original hasta fecha de vencimiento	0,6 – 0,75 mg
		Comprimidos 0,5; 0,6 y 1,2 mg Gotas 0,5 y 0,6 mg/ml	VO	Administrar por la mañana Con las comidas para evitar molestias GI	Dentro del envase original hasta fecha de vencimiento	
	DEXAMETASONA	Sal fosfato: ampollas 4 mg/ml (Decadrón®)	IM	Puede ser aplicada directamente o diluida en Dx 5% o SF	Dentro del envase original hasta fecha de vencimiento Proteger de la luz	
			Bolo EV			
			Infusión EV			
Sal fosfato+acetato: ampollas 10 mg/ml (Duo-Decadrón®)	IM	Suspensión inyectable únicamente para uso IM	Dentro del envase original hasta fecha de vencimiento			
	Comprimidos 0,5 y 4 mg	VO	Administrar por la mañana Con las comidas para evitar molestias GI	Dentro del blíster hasta fecha de vencimiento	0,75 mg	

Referencias: amp: ampollas; API: agua para inyectables; Cc: concentración; Dx 5%: dextrosa al 5%; EV: endovenosa; GI: gastrointestinales; IM: intramuscular; Máx: dilución máxima; mg: miligramos; min: minutos; ml: mililitros; Seg: segundos; SF: solución fisiológica; VO: vía oral.

Bibliografía: UpToDate 2016; Prospectos de productos farmacéuticos; Lacy y otros. "Drug Information Handbook" 7 th Ed 1999-2000.