



IÓN	SAL	PRESENTACIÓN	EQUIVALENCIAS	INDICACIONES	ADMINISTRACION	PRECAUCIONES
Potasio (K): 1 mEq = 1 mmol = 39 mg	Cloruro	3 mEq/ml ampollas por 5ml	3 mEq/ml	Hipokalemia (K< 3,5 mEq/L)	Vía periférica: Cc máx: 10 mEq/100 ml - velocidad máx: 10 mEq/h Vía central: Cc máx: 20-40 mEq/ 100ml - velocidad máx: 40 mEq/h Solventes compatibles: Dx 5% o SF. Como aporte de K debe diluirse en SF	Extravasación: isquemia local y necrosis: frenar la infusión y aspirar la sc extravasada. Aplicar compresas frías secas y elevar la extremidad
		3 mEq/ml solución			Puede diluirse en agua o jugo para reducir la irritación estomacal y/o el efecto laxante	Tomar inmediatamente después de comer o con las comidas
		cápsulas (Control K®)	1 cápsula = 600 mg ClK = 8 mEq K		En caso de no poder tragar las cápsulas, los gránulos pueden dispersarse en la comida o mezclarse con jugo	
	Gluconato	jarabe (Kaon®)	1 cucharada sopera = 15 ml Gluconato de K = 20 mEq K 0,312 g/ml de Gluconato de K = 1,34 mEq/ml de K		En caso de diarrea cambiar a su equivalente de ClK Puede diluirse en agua o jugo para reducir la irritación estomacal y/o el efecto laxante	
	1 cápsula de Cloruro de Potasio (Control K®) = 6 ml Gluconato de Potasio jarabe (Kaon®) = 3 ml Cloruro de Potasio solución 3 mEq/ml					
Sodio (Na): 1 mEq = 1 mmol = 23 mg 1 mEq NaCl = 1 mEq Cl = 1 mEq Na	Cloruro	20% ampollas por 10 o 20 ml	3,4 mEq/ml de Na 198 mg/ml de ClNa = 78 mg/ml de Na	Hiponatremia (Na<135 mEq/l) Diluyente estéril	No administrar EV directo No administrar al 20% sin diluir	
		0,9% ampollas por 1 ml, baxter varios	0,154 mEq/ml Na 8,9 mg/ml de ClNa = 3,5 mg/ml de Na			
		3% solución	514 mEq/l de Na		Preparación: retirar 50 ml aprox de un baxter de 500 ml de Cloruro de Sodio 0,9% y colocar 6 ampollas de Clorurada al 20 % de 10 ml	
Referencias: AC: agua corporal; ACT: Agua corporal total; amp: ampolla; Aprox: aproximadamente; Cl: Cloro; ClK: Cloruro de Potasio; ClNa: Cloruro de Sodio; Dx 5%: dextrosa al 5%; EV: endovenosa; hs: horas; l: litro; máx: máximo; mg: miligramos; ml: mililitros; mEq: miliequivalentes; Na: Sodio; NaHCO3: Bicarbonato de Sodio; P: Potasio; Plasm: plasmático; Sc: Solución; SF: solución fisiológica; VO: vía oral. Bibliografía: UpToDate2016; Drugs.com; Lacy y otros. "Drug Information Handbook" 18 th Ed 2009-2010; Martindale Guía completa de consulta farmacoterapéutica; Prospectos de productos farmacéuticos.						

INCOMPATIBILIDADES ELECTROLITOS

	CLORURO DE CALCIO	GLUCONATO DE CALCIO	SULFATO DE MAGNESIO	CLORURO DE POTASIO	FOSFATO DE POTASIO	FOSFATO DE SODIO	BICARBONATO DE SODIO
CLORURO DE CALCIO			×		×		
GLUCONATO DE CALCIO			×		×	×	×
SULFATO DE MAGNESIO	×	×			×	×	×
CLORURO DE POTASIO							
FOSFATO DE POTASIO	×	×	×				
FOSFATO DE SODIO		×	×				
BICARBONATO DE SODIO		×	×				

Los datos mostrados en esta tabla proceden del fichero de incompatibilidades Stablis®. La presencia de una cruz indica una incompatibilidad entre los fármacos.