



Droga	Cc de dilución recomendada	Sv de dilución	Administración			Estabilidad química				Corrección por IR	Dosis máx	Observaciones
			EV directo (3-5min)	Infusión	IM	Reconstituido		Diluido				
						T° amb	Heladera	T° amb	Heladera			
FOSFOMICINA	1 g/50 ml	Dx 5% SF	NO	1 g/ 60 min	SI Formulación IM	SD	SD	24 hs	SD	SI	16 g/día dividido en 2-4 dosis	4 g en 4 hs con intervalos dependientes de la dosis diaria Contenido de sodio: 330 mg/ampolla de 1 g
GENTAMICINA	Diluir dosis en 50 a 200 ml	Dx 5% SF	SI	30-120 min	NR	Ampolla ya reconstituída		24 hs	24 hs	SI	3 mg/kg/día en 3 dosis o 7 mg/kg/día en 1 dosis	Los aminoglucósidos son inactivados in vitro por beta lactámicos: no mezclar en el mismo sachet
IMIPENEM	500 mg/ 100-250 ml (Máx: 5 mg/ml)	SF Dx 5%	NO	≤ 500 mg: 20-30 min ≥ 750 mg: 40-60 min	SI Formulación IM	4 hs	24 hs	4 hs	24 hs	SI	4 g/día dividido en 4 dosis	Puede producir convulsiones. Si observa náuseas o vómitos durante la infusión, disminuir la velocidad de infusión
LEVOFLOXACINA	500 mg/ 100 ml	Dx 5% SF	NO	500 mg: 60 min 750 mg: 90 min	NO	SD	SD	72 hs	14 días	SI	750 mg/día	Proteger de la luz. Infusión rápida: hipotensión. Adecuada hidratación: produce cristaluria y cilindruria No administrar junto con cationes multivalentes
LINEZOLID	600 mg/300 ml (2 mg/ml)	Original	NO	30-120 min	NO	Sachet listo para infusión				NO	1200 mg/día dividido en 2 dosis	Almacenar al abrigo de la luz. El color amarillo se puede intensificar con el tiempo sin afectar la potencia Contenido de sodio: 114 mg/ampolla de 600 mg
MEROPENEM	1 g/100 ml (Máx: 20 mg/ml)	SF Dx 5%	SI 500 mg/ 10 ml	15-30 min	NO	SF:2 hs Dx:1 h	SF:18 hs Dx:8 hs	SF:4 hs Dx:1 h	SF:24 hs Dx:4 hs	SI	6 g/día dividido en 3 dosis	
METRONIDAZOL	500 mg/100 ml (5 mg/ml)	Original	NO	30-60 min	NO	Sachet listo para infusión				SI	4 g/día dividido en 3-4 dosis	Almacenar al abrigo de la luz Puede oscurecer la orina Dosis de carga (infecciones anaeróbicas): 1000 mg Contenido de sodio: 310,5 mg/sachet de 500 mg
ORNIDAZOL	1 g/250 ml (Máx: 1 g/ 200 ml)	SF Dx 5%	NO	15-30 min	NO	Ampolla ya reconstituída		SD	SD	NO	2 g dividido en 2 dosis	Almacenar al abrigo de la luz
PENICILINA G SÓDICA	3-5 MUI/ 50-100 ml (Máx: 0,1 MUI/ml)	SF Dx 5%	NO	1-2 hs	0,1 MUI/ml	SD	72 hs	24 hs	SD	SI	24 MUI/día, dividido en 6 dosis	Infusiones rápidas pueden causar desbalance electrolítico y convulsiones

